

コサギ



分布	本州以南で繁殖。年間を通じて同じ地域にとどまるもの以外に、日本国内で地域的な移動をするものやフィリピン方面へ渡って越冬するものがある。 ⁽¹⁾
生態	日本で見られるシラサギ類のなかで最も数が多く、体は一番小さい。昼行性で、日中は水田、河川、湖沼、湿地、干潟などの水辺で採食し、マツ林、ヤナギ林、竹林、雑木林などを集団ねぐらまたは集団営巣地とする。 ⁽¹⁾
配慮事項	河川区間内のヤナギ林や竹林等は、サギ類の集団営巣地やねぐらとなっていることが多いので、樹林の伐採や護岸整備による水際線の改変等の諸工事を行う場合は、事前の生息調査が必要である。営巣地・ねぐらとなっている樹林は極力保全することが望ましいが、やむをえず伐採する場合は、繁殖期を避けたり、代替地となる植生を残すといった配慮が必要である。サギ類の集団が生活するには、付近に豊富で安全な餌場があることが大切である。河川や水田の水質や底質を保全するほか、農薬などが餌生物を通じて濃縮されないように安全面でも配慮することが必要である。 ⁽²⁾

(1) 日本動物大百科、日高敏隆、1996

(2) 川の生物図典、財団法人 リバーフロント整備センター、1996

アオサギ




分布	日本では北海道から九州に分布し、北海道では留鳥または漂鳥、九州以南では冬鳥である。 ⁽¹⁾
生態	日本のサギ類としては最大の種である。河川、湖沼、水田、湿地、干潟などの水辺で見られ、山地にはまれである。繁殖は、平地から丘陵地のマツ林、スギ林または広葉樹林に数十羽から数百羽の集団でコロニーをつくって行う。ほかのサギ類と混群で営巣することもあるが、本種だけでコロニーをつくることの方が普通である。 ⁽¹⁾
配慮事項	河川区間内のヤナギ林や竹林等は、サギ類の集団営巣地やねぐらとなっていることが多いので、樹林の伐採や護岸整備による水際線の改変等の諸工事を行う場合は、事前の生息調査が必要である。営巣地・ねぐらとなっている樹林は極力保全することが望ましいが、やむをえず伐採する場合は、繁殖期を避けたり、代替地となる植生を残すといった配慮が必要である。サギ類の集団が生活するには、付近に豊富で安全な餌場があることが大切である。河川や水田の水質や底質を保全するほか、農薬などが餌生物を通じて濃縮されないように安全面でも配慮することが必要である。 ⁽²⁾

(1) 日本動物大百科、日高敏隆、1996

(2) 川の生物図典、財団法人 リバーフロント整備センター、1996

カルガモ



分布	アジアの温帯から熱帯で繁殖し、日本でも全国の低地で普通に繁殖する。 ⁽¹⁾
生態	水辺近くの草むらや休耕田、竹藪などの乾いた地上に営巣する。小さな川でも繁殖する。 ⁽¹⁾
配慮事項	繁殖期にはササ、ヨシ群落、丈の高い水草など、遮断効果のある植生が重要であり、これらを保全する必要がある。また、中洲や浮島など、他の動物が近づきにくい環境も重要である。群れで生活することが多いので、休息のための広い静水域や採餌のための草地や水草が多いことが望ましい。鳥獣保護区や銃猟禁止区域となっている区域が、休息や睡眠に安全な場所として生息密度が高くなる傾向がみられる。 ⁽¹⁾

(1) 川の生物図典、財団法人 リバーフロント整備センター、1996

ヒドリガモ



分布	ユーラシア大陸の北部で広く繁殖し、冬はアフリカ、インド、東南アジア、中国、フィリピン、日本、北アメリカの大西洋岸に移動する。日本には冬鳥として渡来する。 ⁽¹⁾
生態	内湾、湖沼、川などで生活する。他の淡水ガモ類よりも海上に出る傾向が強い。
配慮事項	採餌のための草地や、水草や海藻の生育地があることが望ましい。休息のための広い水面や安全な陸域(干潟等)があることが望ましい。 ⁽¹⁾

(1) 川の生物図典、財団法人 リバーフロント整備センター、1996